COMUNE DI SANT'ARSENIO
Provincia di Salerno

P.U.C.
PIANO URBANISTICO COMUNALE

Norme sul governo del territorio L.R. 22 dicembre 2004 N.16, L.R. 5 aprile 2011 e succ. modd. ed integ.

Up UFFICIO DI PIANO

GERARDINA FORLENZA 09.06.2026 18:58:25 GMT+02:00	RESPONSABILE-COORDINATORE-RUP	RESPONSABILE AREA TECNICA II **arch. Gerardina Forlenza**
	SUPPORTO	URBANISTICA **ing. Pietro Mangieri**
		ESPERTO G.I.S. **geom. Antonio Soriano**
	CONSULENTI SPECIALISTICI	AGRONOMO - VI **dott. for. Vincenzo Spinillo**
		GEOLOGO **dott. Gabriele Morcaldi**
		ACUSTICA **ing. Raffaele De Biase**
		VAS **arch. Fabrizia Bernasconi**
		ARCHEOLOGIA **dott.ssa Angelina Flora**

- INTEGRAZIONI PROVINCIA -

SINDACO dott. DONATO PICA

GIUGNO 2025

Firmato digitalmente da: Gabriele Morcaldi
Data: 28/05/2026 14:43:58

DONATO PICA 09.06.2026 18:59:08 GMT+02:00

TAV. GEO6 D

Carta Idrogeologica

Scala 1:5000

Legenda

- Limite Comunale
- Zona di esondazione

Sorgenti

- Sorgenti e punti d'acqua principali

Pozzi

- Pozzi artesiani e di grande diametro

Direzione di flusso


- Principali direttrici di deflusso idrico sotterraneo all'interno delle strutture di maggiore rilevanza

Limite idrogeologico

- Spartiacque sotterraneo

Dolina

- Cavità di origine carsica
- Elementi idrici
- Faglie e loro probabili prolungamenti



	CLASSI DI PERMEABILITA'					
CODICE	AA	A	M	B	I	DESCRIZIONE IDROGEOLOGICA
dt						**COMPLESSO DEI DEPOSITI EPICLASTICI CONTINENTALI** Detrito di falda sciolto ad elementi calcarei a spigoli vivi e frazione argilloso-limosa; lo spessore è di alcuni metri. MEDIO-ALTA PERMEABILITA'.
A						**COMPLESSO FLUVIO-LACUSTRE** Limi argillosi e sabbiosi bruni con intercalazioni detritico-ciottolose e sabbiose di riempimento lacustre o palustre. ("Complesso alluvionale e lacustre recente"). PERMEABILITA' COMPLESSIVA DA RIDOTTA A MEDIA IN DIPENDENZA DELLA GRANULOMETRIA.
C						**COMPLESSO CALCAREO** Calcari grigio-biancastri in strati e banchi associati a calcareniti e calciruditi ben stratificate. Unità acquifera di elevato spessore (centinaia di metri) con fenomeni carsici ipogei e superficiali. ELEVATA PERMEABILITA' per intensa tettonizzazione. (Possibilità di locale tamponamento ad opera di materiale piroclastico.